BELL MAX está formulado a base de proteínas de origen animal y posee atracción frente a distintas especies de cucarachas. Debido a los agentes inertes e ingrediente activo, su composición aporta excelente efecto insecticida sobre estados juveniles y adultos. Ejerce efecto directo sobre las cucarachas que consumen el gel, e indirecto sobre aquellas que se alimentan de materia fecal o de los cadáveres de insectos muertos por acción del cebo. Es recomendado para realizar aplicaciones en sitios sensibles. Puede utilizarse en lugares donde la posibilidad de desalojar a personas y animales es limitada. Su aplicación es factible en interior y exterior **Interior:** Cocinas, casinos, restaurantes, escuelas, hoteles, oficinas, industrias, etc. **Exterior:** Áreas verdes, cámaras sépticas, drenajes, etc.

MECANISMO DE ACCIÓN: BELL MAX está formulado con un potente y eficaz ingrediente activo. Luego de la ingesta, las cucarachas no presentan síntomas inmediatos, lo que permite que retornen a sus madrigueras, donde a través del traspaso de alimento de boca en boca, por medio del consumo de sus heces o por canibalismo contaminen en forma progresiva a otros adultos y ninfas, produciéndose la muerte 48 a 72 horas post ingesta.

FORMA DE USO: Evitar la presencia de alimentos o restos de materia orgánica que puedan competir con el cebo. Aplicar el gel en gotas pequeñas, del porte de una arveja (0,1 g.). Debe colocarse en aquellos ambientes donde exista presencia de cucarachas. Una vez identificados los sitios infestados (cocina, lavadero, habitaciones, etc.) inspeccionar intensamente muebles, electrodomésticos y puertas de manera de visualizar los nidos, sitios de alimentación o reposo de insectos. No utilice insecticidas o agentes de limpieza mientras realice tratamientos con gel, esto puede afectar la atracción y/o eficacia del producto.

PRECAUCIONES GENERALES

- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- No utilizar directamente sobre las alfombras y tapices.
- No ingerir o inhalar el producto.
- Una vez vacío destruya el envase en forma segura.
- Manténgase alejado de niños, personas NO responsables y animales domésticos.
- Mantenga el envase cerrado y con etiqueta visible.
- No aplicar sobre alimentos o utensilios de cocina, plantas o acuarios.
- No aplicar insecticidas aerosoles sobre el gel porque se inactiva.

Plaga	Dosis M²	Lugares
Cucaracha Alemana (Blatella germánica)	2 - 5 gotas	Cocinas, casinos, restaurantes, escuelas, hoteles, oficinas, industrias,etc. Interior y Exterior
Cucaracha Americana (Periplaneta americana)	5 - 10 gotas	
Cucaracha Oriental (Blatta orientalis)	2 - 5 gotas	

REG. ISP N° P-888/20

COMPOSICIÓN: Cada 100 g. de producto contiene:

- Imidacloprid ..... 2,15 g.
- Otros componentes c.s.p. ..... 100 g.

ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático bajo vigilancia médica.

anasac control

www.anasaccontrol.cl

7 805505 010003

En caso de Emergencia, comunicarse con Centro Toxicológico RITA CHILE al 22777 1994 (Etgo). Horario de atención 24 hrs.

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

anasac control

Veneno

Fabricado y comercializado por:
Anasac Ambiental.
Avenida La Divisa 06,
San Bernardo,
Santiago, Chile.

CLASE III - LIGERAMENTE PELIGROSO

30g.

anasac control

BELL MAX

INSECTICIDA
GEL PARA CUCARACHAS

Cebo alto en proteínas

Control en cadena

NUEVA FÓRMULA MÁS ATRACTIVA

Fácil de usar

ANASAC